

# Brugsanvisning for anvendelse af Propulse SE 250 (18-597) mod svampesygdomme i sukkerroer

## Vilkår

**Dispensationen til behandlingen gælder i perioden den 12. juli til 22. oktober 2024.**

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Propulse SE 250 i sukkerroer mod svampesygdomme. Propulse SE 250 indeholder aktivstofferne: Prothioconazole, 125 g/l og Fluopyram, 125 g/l.

## Advarselstekst:

### *Svampemiddel:*

- Må til denne anvendelse kun anvendes mod svampesygdomme i sukkerroer på friland
- Må ikke anvendes senere end 22. oktober 2024
- Må i sukkerroer ikke anvendes senere end vækststadium 49
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval, sprøjtetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes
- Behandlede sukkerroer må bruges til fodring
- Sprøjteførere skal anvende egnet arbejdsdragt ved blanding, påfyldning og udbringning.
- Ved håndtering af behandlede sukkerroer skal der anvendes arbejdstøj og kemisk bestandige handsker. Desuden skal de angivne nedsatte arbejdstider i sukkerroer overholdes jf. nedenstående:
  - Ved doseringen 2 x 0,55 L/ha må der maksimalt arbejdes i 6 timer/dag med manuel håndtering af behandlede sukkerroer.
  - Ved doseringen 1 x 1,1 L/ha må der maksimalt arbejdes i 5 timer/dag med manuel håndtering af behandlede sukkerroer.
  - Ved doseringen 1 x 1,1 L/ha må der maksimalt arbejdes i 7 timer/dag med manuel aflugning af stokløbere af behandlede sukkerroer.
- Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50% afdriftsreduktion anvendes ved udbringning.
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

Advarsel:

”Se etiketten til Propulse SE 250”

## Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

*Afgrøde, skadevolder, dosering, antal behandlinger, interval, behandlingspunkt og sprøjtefrist*

Afgrøde	Skadevolder	Max Dosering pr. behandling	Antal behandlinger (interval)	Behandlings-tidspunkt (vækststadier)	Sprøjtefrist/ PHI
Sukkerroer	Bederust, bedemeldug, Ramularia og Cercospora	1 x 1,1 l/ha eller	1 x 1,1 l/ha eller	BBCH 31-49 Juli-oktober	BBCH 49
Sukkerroer	Bederust, bedemeldug, Ramularia og Cercospora	Split behandling 2 x 0,55 l/ha	2 x 0,55 l/ha (21 dage imellem de to behandlinger)	BBCH 31-49 Juli-oktober	BBCH 49

**Sprøjteteknik:** Benyt 120-400 l vand pr ha, f.eks. med ISO 025 (lilla), 3 bar og 7 km/time eller ISO 03 (blå), 4 bar og 5,5 km/time. Udbringning kun med traktormonteret sprøjte.

**Risiko for skade:** Behandling med Propulse SE 250 medfører ikke afgrødeskade.

**Bemærkninger:**

Manuel aflugning af stokløbere skal enten foretages før behandling med Propulse SE 250 eller hvis dette ikke er muligt, tidligst 10 dage efter behandling med Propulse SE 250.

Brugsanvisningen er

**GODKENDT**

12. juli 2024

Miljøministeriet  
Miljøstyrelsen  
Tolderlundsvej 5  
5000 Odense C

*Frøeniska Lind*