




**1 liter**

**Ukrudtsmiddel**  
**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i vinterhvede, vinterrug, triticales, vinterbyg, vårhvede og vårbyg uden udlæg af græs.**

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Ukrudtsmiddel nr. 18-569  
 Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

**Analyse**  
 Iodosulfuron-methyl-natrium..... 50 g/l (5,04% w/w)  
 Mesosulfuron-methyl ..... 7,5 g/l (0,75% w/w)  
 Mefenpyr-diethyl (safener) ..... 250 g/l (24,40% w/w)

**Netto 1 liter**  
**Flydende**  
**Midlet er et suspensionskoncentrat**  
**Fabr. nr. og dato: se pakningen**

Produktet er ved korrekt opbevaring og uåbnet emballage holdbart i mindst 2 år efter produktionsdatoen. Produktionsdato påtrykt emballagen.

DK84091979I

Bayer A/S  
 Arne Jacobsens Allé 13  
 DK-2300 København S  
 Tlf. 4523 5000  
 www.cropscience.bayer.dk

**Bayer**

Reg.nr. 18-569

**FARE**

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Forårsager hudirritation (H315).

Forårsager alvorlig øjenskade (H318).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Bær beskyttelseshandsker (P280).

Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i vinterhvede, vinterrug, triticales, vinterbyg, vårhvede og vårbyg uden udlæg af græs.**

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i hvede, triticales, rug og byg ikke anvendes senere end vækststadium 32.

For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august – 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifen-sulfuron-methyl (SPe<sub>1</sub>).

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe<sub>3</sub>).

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (Spe<sub>3</sub>).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (Spe<sub>1</sub>).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

**Førstehjælp**

**Indånding:** Bring personen i frisk luft.

**Hud:** VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. (P302+P352).

Ved hudirritation: Søg lægehjælp (P332+P313).

Forurenede tøj tages af og vaskes, før det bruges igen (P362).

**Øjne:** VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).

**Indtagelse:** Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. (P310).

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).



UFI: PYU0-30GP-T00E-J31N

Virkningsmekanisme

**GRUPPE 2 HERBICID**



**UN 3082**

<b>LITOTRYK</b>	<b>PMR: DK84091979I</b>	<b>Bayer CropScience DK</b>	
	Form.: 297x150 mm	Date: 14-09-2022	<input type="checkbox"/> Use only for corrections
	Artwork: 4942E	Country: DK	<input checked="" type="checkbox"/> Print Ready PDF for upload to Server
	Job no.:	Colour: <b>CMYK</b>	

## BRUGSANVISNING

### Brugsområde

Hussar Plus OD kan anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i vinterhvede, vinterrug, vinterbyg og triticales, samt i vårbyg og vårhvede. Hussar Plus OD kan anvendes 1 gang pr. afgrøde fra væksten går i gang om foråret til afgrødens BBCH 32. Maximum 140 ml /ha afhængig af afgrødens udvikling – dog max 50 ml/ha i vinterbyg og 70 ml/ha i vårbyg og vårhvede, se også afsnittet begrænsninger.

### Virkningsspektrum

Hussar Plus OD er et meget bredtvirkende ukrudtsmiddel med effekt på både græs- og bredbladet ukrudt. Hussar Plus OD virker bl.a. på vindaks, rajgræs, burresnerre, kamille, fuglegræs, spildraps og en lang række andre ukrudtsarter, se afsnittet doseringsvejledning for flere oplysninger.

### Virkningsmekanisme

Hussar Plus OD indeholder aktivstofferne mesosulfuron-methyl og iodosulfuron-methyl-Na, der begge tilhører stofgruppen sulfonylurea. Optagelsen sker i altovervejende grad gennem ukrudtets blade, og efter optagelsen transporteres aktivstofferne ind i plantens celler, hvor stoffet virker ved at hæmme dannelsen af de for planter så livsvigtige aminosyrer, isoleucin og valin. Hussar Plus OD indeholder en safener, der betyder at afgrøden ikke påvirkes.

Efter optagelsen standser væksten i løbet af få dage. Efter 10 - 15 dage ses en gulfarvning af de yngste plantedele, og ukrudtet begynder at falde sammen, for at visne væk i løbet af de næste 2 - 4 uger. Græsukrudt kan dog stå i bunden af afgrøden i lang tid som små stærkt mørkegrønne planter, men disse planter optager ikke næring eller generer afgrøden.

Ved anvendelse af Hussar Plus OD er det vigtigt at ukrudtet er i aktiv vækst for at aktivstofferne i Hussar Plus OD kan optages og transporteres frem til ukrudtets vækstpunkter.

### Resistens

Hussar Plus OD indeholder aktivstoffet iodosulfuron og mesosulfuron, der begge tilhører stofgruppen sulfonylurea og tilhører HRAC resistensgruppe 2, der vurderes at have en middel/høj risiko for udvikling af resistens. Blandt de arter som Hussar Plus OD er virksomt overfor, er der i Danmark fundet resistens hos fuglegræs, kamille, kornvalmue, vindaks og rajgræs.

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i udvikling af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum. Desuden anbefales det at anvende kulturtekniske metoder, som pløjning, sædskifte mm. for at dæmpe ukrudtstrykket og modvirke resistensudvikling.

### Doseringsvejledning

Under gode virkningsbetingelse kan der forventes effekter i størrelsesorden 85% ved de doseringer som er angivet nedenfor i effektskemaet. Der bør tilsættes 0,5 l Mero, Renol eller tilsvarende vegetabilsk superolie til Hussar Plus OD.

Vær opmærksom på at den maksimale dosering i vinterbyg er 50 ml/ha.

Ukrudtsarter	Vinterhvede, rug, triticales og vinterbyg (Vinterbyg max 50 ml/ha)		Vårbyg og vårhvede
	Småt ukrudt	Større ukrudt	
Agerkål	50 ml Hussar Plus OD	75 ml Hussar Plus OD	50 ml Hussar Plus OD
Agersennep			
Fuglegræs			
Hanekro			
Hyrdetaske			
Pengeurt			
Lugtløs kamille			
Spildraps	100 ml Hussar Plus OD	125 ml Hussar Plus OD	35 ml Hussar Plus OD + blandingspartner
Pileurt bleg/fersken			
Kornvalmue	100 ml Hussar Plus OD	140 ml Hussar Plus OD	70 ml Hussar Plus OD
Burresnerre			
Melde			
Pileurt, snerle			
Pileurt vej	140 ml Hussar Plus OD		
Enårig rapgræs			
Vindaks			
Rajgræs, alm./ital.	140 ml Hussar Plus OD		
+ ærenpris, stedmoder	+ DFF		+ DFF

### Blandinger

For at opnå effekt på agerstedmoder og ærenpris anbefales det at Hussar Plus OD blandes med en egnet partner f.eks. DFF. I vårsæd kan der ved forekomst af pileurter, melde og burresnerre, blandes med en egnet blandingspartner evt. Starane XL. Check altid godkendelsesstatus og følg etikettens anvisninger for blandingspartnere.

Hussar Plus OD kan blandes med relevante ukrudts og svampemidler samt med manganchelat eller mangansulfat. Ved blanding med mangansulfat bør der maksimalt anvendes 2 kg/100 ltr vand, og der må IKKE blandes med Mero, Renol eller andre olier. Normalt blandes højst 2 midler.

Hussar Plus OD må der ikke blandes med midler indeholdende tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl .

### Sprøjetidspunkt

**Vinterhvede, rug og triticales:** Hussar Plus OD udsprøjtes om foråret når væksten er startet

og evt. forårsfremspiring er sket. Hussar Plus OD kan anvendes frem til og med BBCH 32. (2. knæ mærkbar). Frem til BBCH 22 er maksimal dosis 110 ml/ha, derefter maksimalt 140 ml/ha.

**Vinterbyg:** Hussar Plus OD udsprøjtes om foråret når væksten er startet. Hussar Plus OD kan anvendes frem til BBCH 32. Vær opmærksom på at der i vinterbyg er en maksimaldosering på 50 ml af hensyn til afgrødepåvirkning, derfor bør tidlig behandling på småt ukrudt tilstræbes.

**Vårbyg og vårhvede:** Hussar Plus OD udsprøjtes så snart ukrudtet er fremspiret, og inden afgrøden er i BBCH 30 (beg. strækning).

Dagtemperaturer bør være over 6-8 °C. Vær opmærksom på at f.eks. rajgræs er senere i vækst end f.eks. enårig rapgræs. Der bør ikke behandles med udsigt til nattefrost.

#### Sprøjeteknik

Hussar Plus OD udsprøjtes med en teknik der sikrer en god og ensartet dækning af ukrudtsplanterne. Langsom fremkørsel og fin forstøvning er vigtig for at sikre god dækning af græsukrudt. Anvend fladsprededyser, f.eks. en ISO 110-02 dyse med et tryk på 2,6 bar, og 6 km/t, 150 l vand pr. ha. LowDrift dyse ISO 02 og 2,0 – 3,0 bar med medium forstøvning kan være et alternativ, hvis man derved kan opretholde det korrekte sprøjetidspunkt.

Hussar Plus OD anvendes normalt med tilsætning af 0,5 l/ha Mero eller Renol olie. Dog kan en evt. blandingspartner stille krav om andet additiv eller slet ingen tilsætning.

#### Fremstilling af sprøjtevæskan

Kemikalierne tilsættes i sprøjtes fyldeudstyr samtidig med vandpåfyldning og omrøring. Ved tankblanding bør det først tilsatte middel være væk fra fyldeudstyret inden næste middel tilsættes.

Foretag konstant omrøring af sprøjtevæskan under transport og udsprøjtning. Ved håndtering af plantebeskyttelsesmidler anvendes personligt beskyttelsesudstyr, såsom egnede handsker og briller.

#### Rengøring af sprøjteudstyr

Der skal anvendes spuledyser ved den indvendige vask af sprøjten. Uvasket sprøjte eller traktor, der er anvendt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, skal placeres på behandlet areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag. Restsprøjtevæskan skal i forbindelse med indvendig vask af sprøjter fortyndes mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering, som er anført på etiketten af de anvendte midler, må ikke herved overskrides på markniveau.

Der bør anvendes et ammoniumbaseret rengøringsmiddel f.eks. All Clear Extra.

**Da nogle afgrøder er meget følsomme overfor selv små rester Hussar Plus OD er grundig rengøring meget vigtig.**

**I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016.**

#### Begrænsninger

Den maksimalt tilladte dosering efter afgrødens vækststadiet.

Afgrøde	Afgrødestadie BBCH	Maksimaldosering
Vinterhvede,	BBCH. 13-22	110 ml
Vinterrug, tritiale,	BBCH. 23-32	140 ml
Vårbyg og vårhvede	BBCH. 13-30	70 ml
Vinterbyg	BBCH. 13-32	50 ml

En behandling med Hussar Plus OD kan give en forbigående gulfarvning af afgrøden og der er set tilfælde af stråforkortning, dette har normalt ingen indflydelse på udbyttet.

Planter der er stressede på grund af tørke, stærk varme, frost, sygdomme, dårlig overvintring, næringsmangel eller andre årsager bør ikke behandles.

Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl (SPe1).

#### Efterfølgende afgrøde

Da Hussar Plus OD hurtigt nedbrydes i jorden, kan der året efter anvendelse dyrkes alle normale markafgrøder. Efter en tør sommer anbefales pløjning forud for vinterraps, medens en grundig harvning er tilstrækkeligt under normale forhold.

#### Rester og tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæskan.

Emballagen må ikke genbruges.

#### Opbevaring

Hussar Plus OD bør opbevares tørt og frostfrit.

#### Ansvar

Bayer fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

9.2018

® is a registered trademark of the Bayer Group

Bayer A/S  
Arne Jacobsens Allé 13  
DK-2300 København S  
Tlf. 4523 5000  
www.cropscience.bayer.dk

**Bayer**

**Mindre anvendelse af Hussar Plus OD (Reg.nr. 18-569) om foråret mod ukrudt i engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel til frøavl.**

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

**Vejledning for brug af Hussar Plus OD om foråret mod ukrudt i engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel til frøavl.**

**Ukrudtsmiddel**

- Må kun anvendes i engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel til frøavl.
- Halm må ikke bruges til opfodring.
- Max 2 behandlinger om foråret i marts-april.
- Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer, mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
- Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra § 3-områder for at beskytte vilde planter.
- For at beskytte grundvandet må der i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, tria-sulfuron eller thifen-sulfuron-methyl.

**Advarsel**

Se Hussar Plus OD etiketten.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

**Brugsanvisning for Hussar Plus OD om foråret mod ukrudt i engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel til frøavl.**

**Bekæmpelse:**

En række en- og tokimbladet ukrudtsarter.

**Dosering:**

**Enkeltbehandling:** 0,05-0,14 l/ha Hussar Plus OD + 0,5 l/ha Renol om foråret ved vækststart.

**Split:** 2x0,07 l Hussar Plus OD pr ha + 0,5 l Renol pr. ha. 1. gang ved vækststart og 2. behandling 10-14 dage senere.

Hussar Plus OD kan give skader på afgrøden. Derfor må svækkede afgrøder aldrig behandles.

**Sprøjtetidspunkt:**

Må tidligst anvendes i marts og senest i april.

**Risiko for skade**

For at til passe vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

31. marts 2016

**UN 3082**



### Brugsanvisning til mindre anvendelse af Hussar Plus OD (18-569) mod en-årig rapgræs i engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel til frøavl.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

### Vejledning for Hussar Plus OD (18-569) mod en-årig rapgræs i engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel til frøavl.

#### Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes mod en-årig rapgræs i engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel til frøavl.
- Halmen og rester må ikke opfodres.
- Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer, mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
- Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra § 3-områder for at beskytte vilde planter.
- For at beskytte grundvandet må der i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tri-benuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl.

#### Advarsel:

"Se Hussar Plus OD etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

### Brugsanvisning

**Skadegørere:** En-årig rapgræs

#### Dosering:

1. Kombination efterår/forår:
  1. sprøjtning: 0,05 l Hussar Plus OD + 0,5 l Mero EC 80 pr. ha efterår før 15. september.
  2. sprøjtning: 0,05-0,09 l Hussar Plus OD + 0,5 l Mero EC 80 pr. ha forår så snart væksten starter.
2. Kombination forår/ samme forår
  - 0,07 l Hussar Plus OD + 0,5 l. Mero EC 80 1. sprøjtning omkring 1. april eller så snart væksten er i gang.
 Eventuelt gentages behandling ved ny fremspiring af en-årig rapgræs.  
Den maksimale dosering af Hussar Plus OD er 0,14 l/ha pr. vækstsæson

Opfølgning på en efterårsbehandling med Hussar Plus OD eller en splitbehandling med Hussar Plus OD i engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel må kun finde sted på arealer med normalt plantedække og som ikke er skadet af behandling med Reglone eller skadet af vinteren.

#### Risiko for skade:

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

19. maj 2017

### Brugsanvisning til mindre anvendelse af Hussar Plus OD (18-569) mod vindaks, alm. rajgræs, italiensk rajgræs og enårig rapgræs i vinterhvede, vinterrug, triticales, vinterbyg, vårhvede og vårbyg med udlæg af engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel til frøavl.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

### Vejledning for Hussar Plus OD (18-569) mod vindaks, alm. rajgræs, italiensk rajgræs og enårig rapgræs i vinterhvede, vinterrug, triticales, vinterbyg, vårhvede og vårbyg med udlæg af engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel til frøavl.

#### Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes om foråret til bekæmpelse af vindaks, alm. rajgræs, italiensk rajgræs og enårig rapgræs i vinterhvede, vinterrug, triticales, vinterbyg, vårhvede og vårbyg med udlæg af engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel til frøavl.
- Må i hvede, triticales, rug og byg ikke anvendes senere end vækststadium 32.
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, sprøjtetidspunkt og sprøjtefrist skal overholdes.
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
- Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter.
- For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august – 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl.

#### Advarsel:

"Se Hussar Plus OD etiketten".

### Brugsanvisning

**Skadegørere:** Vindaks, alm. rajgræs, italiensk rajgræs samt enårig rapgræs.

#### Dosering:

Afgørde	Vækststadiet (BBCH)			
	13-22	23-32	33-39	40-49
Vinterhvede, vinterrug, triticales	0,05-0,11 L/ha *	0,05-0,14 L/ha *		
Vinterbyg			0,05 L/ha *	
Vårbyg, vårhvede				0,035-0,07 L/ha *

\* + 0,5 l Mero EC 80

Antal behandlinger: Max. 1 gang per vækstår.

**Bemærkninger:** Denne godkendelse til mindre anvendelse gælder kun forårsanvendelse uanset afgrødens vækststadiet.

#### Risiko for skade:

Hussar Plus OD kan give skader på afgrøden. Derfor må svækkede afgrøder aldrig behandles.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

14. september 2017



# hussar<sup>®</sup> OD

## PLUS

1 liter

### Ukrudtsmiddel

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i vinterhvede, vinterrug, triticale, vinterbyg, vårhvede og vårbyg uden udlæg af græs.**

**Gældende fra 26. november 2015:** Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Ukrudtsmiddel nr. 18-569

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

#### Analyse

Iodosulfuron-methyl-natrium..... 50 g/l (5,04% w/w)  
Mesosulfuron-methyl ..... 7,5 g/l (0,75% w/w)  
Mefenpyr-diethyl (safener) ..... 250 g/l (24,40% w/w)

Netto 1 liter

Flydende

Midlet er et suspensionskoncentrat

Fabr. nr. og dato: se pakningen

Produktet er ved korrekt opbevaring og uåbnet emballage holdbart i mindst 2 år efter produktionsdatoen. Produktionsdato påtrykt emballagen.

Bayer A/S  
Arne Jacobsens Allé 13  
DK-2300 København S  
Tlf. 4523 5000  
www.cropscience.bayer.dk

# Bayer

DK84091979I

Reg.nr. 18-569

### FARE

**Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).**

Forårsager hudirritation (H315).

Forårsager alvorlig øjenskade (H318).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Bær beskyttelseshandsker (P280).

Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i vinterhvede, vinterrug, triticale, vinterbyg, vårhvede og vårbyg uden udlæg af græs.**

**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**

**Må i hvede, triticale, rug og byg ikke anvendes senere end vækststadium 32.**

**For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august – 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifen-sulfuron-methyl (SPe<sub>1</sub>).**

**Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe<sub>3</sub>).**

**Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter (Spe<sub>3</sub>).**

**Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.**

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SPe<sub>1</sub>).

**Opbevares utilgængeligt for børn (P102).**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

### Førstehjælp

**Indånding:** Bring personen i frisk luft.

**Hud:** VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. (P302+P352).

Ved hudirritation: Søg lægehjælp (P332+P313).

Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen (P362).

**Øjne:** VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).

**Indtagelse:** Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. (P310).

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).



UFI: PYU0-30GP-T00E-J31N

Virkningsmekanisme

**GRUPPE 2 HERBICID**



## UN 3082