



*Høj
koncentration
720 g/kg*



*Højt
effektniveau*



*Minimum
affald*



*God effekt, selv under
svære betingelser*

Roundup POWERMAX XXL

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning, samt stødbehandling af fældede træer og buske jf. brugsanvisningen.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

ROUNDUP POWERMAX XXL er et systemisk ukrudtsmiddel, der påføres bladene. Beregnet til behandling af korn og visse andre afgrøder før fremspiring og før høst, destruktion af græsmarker og bekæmpelse af ukrudt i stub, frugtplantager, på braklagte arealer, i skov og juletræer.

Midlet er et vandopløseligt granulat (SG)

Aktivstof: 720 g/kg (72 % w/w) glyphosatsyre
(i form af 832 g/kg (83,2 % w/w) ammoniumsalt af glyphosat)

Registreringsnr.: 18-684

Parti nr.: (se emballage)

Produktionsdato: (se emballage)

Udløbsdato: mindst 2 år efter produktionsdato.

Emballagestørrelser: 10 kg

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Registreringsindehaver:

Bayer A/S

Arne Jacobsens Allé 13

DK-2300 København S, Danmark

® is a registered trademark of the Bayer Group


UFI: JAW1-W0QC-800Y-WSQY



Virkningsmekanisme

GRUPPE 9 HERBICID

Giftlinjen Ring: +45 82 12 12 12



Påfyldningsudstyr:

- Fyld sprøjletanken 2/3 op med den beregnede vandmængde.
- Påbegynd omrøringen.
- Fyld påfyldningsudstyret halvt op med vand.
- Tilslut den beregnede produktmængde til 2 cm under vandoverfladen.
- + 6. Åbn ventilen for tømning til tanken og luk når beholderen er tom. Det er vigtigt, at lukke ventilen mellem hver påfyldning.

AFGRØDER

Ukrudtsbekæmpelse for såning, herunder nedvisning af efterafgrøder og eftersåning for fremspræng. Pletsprøjtning på mindre områder af marken i foderafgrøder (raps, korn, lupin, ærter, bønner, hestebønner, hør og græs). Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i sennepsfrø. Selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved brug af weed wiper. Ukrudtsbekæmpelse på stubmarker. Omlægning af brak- og græsmarker. Stødbehandling af fældede træer og buske. Ukrudtsbekæmpelse i skovkulturer, juletræsplantager, frugttræer og bærbuske. Ukrudtsbekæmpelse på udrykkelige arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable.

VIKREMÅDE

Roundup POWERMAX XXL er et ikke-selektivt, systemisk ukrudtsmiddel der optages gennem bladene og fordeler sig med plantens saftstrøm rundt i hele planten. Produktet er en herbicid, som blokerer syntesen af aromatiske aminosyrer ved at inhibere enzymet EPSP-syntase. Behandling med Roundup POWERMAX XXL skal foretages på tørre planter. Den bedste effekt opnås, når planterne er i god vækst. Temperaturer over 15 grader, tilpas jordfugtighed og høj luftfugtighed vil sædvanligvis give det bedste resultat. Roundup POWERMAX XXL bindes umiddelbart til jorden og inaktiveres derfor ved kontakt med jorden. Nedbrydning af Roundup POWERMAX XXL sker hovedsageligt mikrobielt.

Bemærk: Under nedbrydning af store mængde plantematerialer, f.eks. kvikrødder, kan der i nogle tilfælde dannes spirehæmmede stoffer. En grundig jordbearbejdning kan forhindre eller mindske problemet.

JORDBEARBEJDNING

Efter behandling med Roundup POWERMAX XXL kan jordbearbejdningen først begynde, når ukrudtet er såvirket af glyphosat, dog tidligst efter ti dage (syv dage ved behandling om foråret). Direkte såning kan ske en dag efter behandling mod etårigt ukrudt, to dage efter behandling mod kvik og fem dage efter behandling mod flerårigt tokimbladet ukrudt. Ved lave temperaturer i længere tid kan jordbearbejdning først ske efter fem dage.

REGNFÆSTHED OG TEMPERATUR

Regnfæst efter 1 time. Temperaturen skal være mellem - 0 - 30 grader for at opnå maksimal effekt.

RESISTENS

Produktet tilhører resistensklasse 9 (EPSP syntase hæmmer). For at forhindre eller forsinke en mulig udvikling i forbindelse med brugen af Roundup POWERMAX XXL bør følgende retningslinjer følges:

- Undgå ensidig gentagen brug af Roundup POWERMAX XXL eller andre glyphosatprodukter.
- Etabler et sædskifte, der sikrer brugen af andre midler med en anden virkemekanisme, og som kontrollerer de samme ukrudtsplanter som Roundup POWERMAX XXL.
- Anvend mekanisk ukrudtsbekæmpelse eller andre dyrkningsmetoder, når det er praktisk muligt.
- Undgå at ukrudtsføre fra evt. resistente planter flyttes til andre marker ved f.eks. at rengøre høstmaskiner.

Midlet må kun opbevares i originalemballagen.

UKRUDTSBEKÆMPELSE FOR SÅNING, HERUNDER NEDVISNING AF EFTERAFGRØDER OG EFTER SÅNING FOR FREMSPIRING.

Roundup POWERMAX XXL anvendes mod kvik samt andet fremspiret ukrudt. Effekten afhænger dog meget af udviklingsstadiet på kvikken. Kvikken skal have minimum 3 - 4 blade på sprøjtedispenspunkt. Om foråret vil kvikken normalt ikke være så veludviklet, hvorfor der må påregnes lavere effekt.

Ikke udvintrede kornplanter i en ellers udvintret vintersædmark kan ikke bekæmpes når der er vækst i planterne. Ved direkte såning, fjernes halm og andet plantemateriale inden behandlingen. Ved behandling umiddelbart efter direkte såning kræves det, at udsæden er godt dækket.

For såning/ for plantning alle afgrøder (BBCH 00)	Antal beh./vækstår	Anbefalet dosering (kg/ha)	Max. dosering/vækstår (kg/ha)
Et- og flerårigt ukrudt	1	0,50-2,00	2,00

PLETSPRØJTNING EFTER FREMSPIRING OG FØR HØST I FODERAFGRØDER

Pletsprøjtning mod flerårigt ukrudt efter fremspræng og før høst. Ved pletsprøjtning forstås behandling med Roundup POWERMAX XXL på mindre områder af marken. Kvik skal på sprøjtedispenspunkt være i aktiv vækst. Behandlingsfrist 10 dage. Max behandling er 1 gang pr. vækstår.

Ukrudt	Dosering
Kvikbestand med færre end 25 skud pr m²	1 x 1,50 kg/ha
Kvikbestand med mere end 25 skud pr m²	1 x 2,00 kg/ha
Flerårigt tokimbladet ukrudt (f.eks. tidsel)	1 x 1,50-2,00 kg/ha



KARTOFLER - BEHANDLING EFTER LÆGNING OG FØR FREMSPIRING

Behandling udføres efter lægning og før fremspræng af kartoflerne til bekæmpelse af tidligt fremspiret ukrudt. Roundup POWERMAX XXL skal udbringes mindst 5 dage før de første spirer bryder igennem jorden. Når kartoffelspирnerne begynder at løfte jordskorpen, er det for sent at anvende Roundup POWERMAX XXL da spirerne kan tage skade. Vær opmærksom på, om der er dybe revner i jorden eller hvis jorden er meget knoldet, så kan en behandling være risikabel, idet spirerne kan rammes flere centimeter nede i jorden med Roundup POWERMAX XXL. Roundup POWERMAX XXL må ikke anvendes i læggekartotler.

Anvendelse	Antal beh./vækstår	Anbefalet dosering (kg/ha)	Max. dosering/vækstår (kg/ha)
Et- og flerårigt ukrudt	1	0,50-2,00	2,00

ROER, HESTEBØNNER, MAJS ELLER ANDRE SÆDE AFGRØDER - BEHANDLING EFTER SÅNING OG FØR FREMSPIRING

Behandling udføres efter såning og før fremspræng af afgrøderne til bekæmpelse af tidligt fremspiret ukrudt. Lav et godt såbed og sørg for, at frøene er dækket af jrd. Roundup POWERMAX XXL skal udbringes mindst 5 dage før de første spirer bryder igennem. Når spirerne begynder at løfte jordskorpen, er det for sent at anvende Roundup POWERMAX XXL, da spirerne kan tage skade. Vær opmærksom på, om der er revner i jorden eller hvis jorden er meget knoldet, så kan en behandling være risikabel, idet spirerne kan rammes med Roundup POWERMAX XXL.

Anvendelse	Antal beh./vækstår	Anbefalet dosering (kg/ha)	Max. dosering/vækstår (kg/ha)
Et- og flerårigt ukrudt	1	0,50-2,00	2,00

SENNEP FØR HØST OG NEDVISNING

Afgrøden behandles, når vandindholdet i frøene er under 30% (fra vækststadiet 87). Sprøjtedispenspunkt vil indtræde 2-4 dage for normal skårlægning. Behandlede afgrøder høstes direkte mellem 14 og 21 dage efter sprøjtning. Afgrøder til udsæd må ikke behandles. Behandlingsfrist 10 dage.

Anvendelse	Antal beh./vækstår	Anbefalet dosering (kg/ha)	Max. dosering/vækstår (kg/ha)
Et- og flerårigt ukrudt	1	1,00-1,50	1,50
Nedvisning af sennep	1	1,50	1,50

SELEKTIV UKRUDTSBEKÆMPELSE VED HJÆLP AF WEED-VIPER

Behandling med Weed-Viper kan udføres på ukrudt, som er 20 cm højere end afgrøden. Det er vigtigt, at weed-viperen ikke kommer i kontakt med afgrøden.

Afgrøder	Dosering	Opløsning
Roer	1,45-2,00 kg/ha	16-22% opløsning pr. behandling

STUBMARKER EFTER HØST

Roundup POWERMAX XXL anvendes til bekæmpelse af et- og toårigt ukrudt samt spildkorn. Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken kan komme i god vækst. I tilfælde af, at halmen snittes efter høst, må den snittes fint og fordeles godt på marken, så halmen ikke dækker for kvik og andet ukrudt. Når kvikken har 3 - 6 aktive blade, kan der behandles med Roundup POWERMAX XXL. Behandling bør altid foretages på uarbejdet jord efter høst, når ukrudtet er i god vækst. Enkelte frostnætter med temperaturer ned til -3 °C for behandling vil ikke have indflydelse på virkningen. Doseringen på 2,25 kg/ha kan anvendes på kvik, når følgende betingelser er tilstede: Høj luftfugtighed, temperaturer over 15° C, solskin og tørre planter, gerne behandling om formiddagen for at opnå optimal effekt.

Stubmarker efter høst	Antal beh./vækstår	Anbefalet dosering (kg/ha)	Max dosering/vækstår (kg/ha)
Genspiret korn og småt etårigt ukrudt	1	0,75 - 1,50	3,00
Et- og flerårigt ukrudt	1	2,25 - 3,00	3,00



BRÅKMARKER OG GRÆS

Brakmarker: Roundup POWERMAX XXL må kun anvendes en gang pr. vækstår. Brakmarker bør ikke jordbehandles før behandling. Jordbearbejdning kan påbegyndes 5 dage efter Roundup POWERMAX XXL behandlingen. Omlægning af græsmarker eller græsarealer: Roundup POWERMAX XXL må kun anvendes en gang pr. vækstår. Ukrudtet og kvikken (kvik 3 - 6 aktive blade) bør være veludviklet og i god vækst på sprøjtedispenspunkt. Vær sikker på, at kvikken ikke er dækket af afgrøden. Behandlingsfrist 10 dage. Græs behandlet med glyphosat må ikke længere anvendes til foder.

Anvendelse	Antal beh./vækstår	Anbefalet dosering (kg/ha)	Max dosering/vækstår (kg/ha)
Brakmarker	1	1,50-3,50	3,50
Græs	1	1,50-3,00	3,00

Mellem eller under FRUGTTÆRER OG BÆRBUSKE

Frugttærrer omfatter bl.a. æble, pære, blomme og kirsebær. Bærbuske omfatter bl.a. solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, hindbær, brombær, hyben, aronia, hind, hassel, spåen, honningbær, ellebladet bærnispele, mirabel, selvblat, jostabær, kirsebærkornel, druer og havorn. Der kan behandles med Roundup POWERMAX XXL mellem eller under frugttærrer og bærbuske på ukrudt i aktiv vækst. Frugttærrer og bærbuske skal være rodfæstede før behandling med Roundup POWERMAX XXL. Det anbefales kun at gentage behandlingen, hvis der er nyfremspiret ukrudt eller genvækst 28 dage efter den foregående behandling. Afgrøderne bør ikke behandles med Roundup POWERMAX XXL fra sidst i juni. Fra sidst i juni når saftstrømmen vender, vil der være risiko for skader på træerne eller buskene, hvis bladene rammes. Behandlingsfrist 30 dage. Mellem eller under frugttærrer og bærbuske anvendes afskærmingsprøjtning eller rygsprøjtning. Pas på vinddrift. Bemærk at der kan være risiko for, at der i en bestand af samme træart kan forekomme rodsammenfletninger, og dermed mulighed for overførsel af Roundup POWERMAX XXL fra et behandlet træ til nabotræet.



Høj koncentration
720 g/kg

Højt effektniveau

Minimum affald

God effekt, selv under svære betingelser

Roundup PowerMax XXL Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning, samt stødbehandling af fældede træer og buske jf. brugsanvisningen.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. ROUNDUP POWERMAX XXL er et systemisk ukrudtsmiddel, der påføres bladene. Beregnet til behandling af korn og visse andre afgrøder for fremspræng og før høst, destruktion af græsmarker og bekæmpelse af ukrudt i stub, frugtplantager, på braklagte arealer, i skov og juletræer.

Midlet er et vandopsløseligt granulat (SG)

Aktivstof: 720 g/kg (72 % w/w) glyphosatsyre (i form af 832 g/kg (83,2 % w/w) ammoniumsalt af glyphosat)

Registreringsnr.: 18-684

Parti nr.: (se emballage)

Produktionsdato: (se emballage)

Udløbsdato: mindst 2 år efter produktionsdato.

Emballagestørrelse: 10 kg

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmidelforordningen 1107/2009.

Registreringsindehaver: Bayer A/S, Arne Jacobsens Allé 13 DK-2300 København S, Danmark

Dette ukrudtsmiddel er til professionel brug.



SKOVBRUG OG PLANTESKOLE

Klærgøring af areal inden såning, pøking eller plantning

Inden såning, pøking eller plantning behandles arealet med Roundup POWERMAX XXL. Ukrudtet bør være veludviklet og i aktiv vækst på behandlingsdispenspunkt. Det anbefales kun at gentage behandlingen, hvis der er nyfremspiret ukrudt eller genvækst 28 dage efter den foregående behandling. Mod tokimbladet flerårigt ukrudt og kvik anvendes den højeste dosering. Bedst effekt opnås, når ukrudtet er i aktiv vækst.

Afskærmingsprøjtning

Behandling med Roundup POWERMAX XXL foretages afskærmning i ukrudtets vækstperiode med udstyr, som afskærmer sprøjtevæsken, således at kulturræet ikke rammes af blade, nåle eller bark. Pas på drift. Ukrudtet bør være veludviklet og i aktiv vækst på behandlingsdispenspunkt. Det anbefales kun at gentage behandlingen, hvis der er nyfremspiret ukrudt eller genvækst 28 dage efter den foregående behandling. Mod tokimbladet flerårigt ukrudt og kvik anvendes den højeste dosering. Bedst effekt opnås, når ukrudtet er i aktiv vækst. Kulturræer skal være rodfæstede.

Skovbrug og planteskole - kulturforberejdelse og afskærmning	Antal beh./vækstår	Sprøjtinterval	Anbefalet dosering (kg/ha)	Max dosering/vækstår (kg/ha)
Et- og flerårigt ukrudt	1		0,50-3,00	3,00
Et- og flerårigt ukrudt	2	28	0,50-3,00	3,50
Et- og flerårigt ukrudt	3	28	0,50-3,00	3,50

JULETRÆER OVER TOPPEN

Behandling med Roundup POWERMAX XXL kan foretages i rødgran, nordmannsgran og kæmpegran (grandis). Der er ikke afprøvninger af andre træarter. Ukrudt bekæmpes i juletræer over toppen på små træer om efteråret, når træernes årsskud er afmodne (forvædede), og endeknopperne er dannede. Behandlingen foretages tidligst, når juletræerne er groet godt fast på det permanente voksested, og ukrudtet er i aktiv vækst.

Rødgran, nordmannsgran og kæmpegran	Antal beh./vækstår	Anbefalet dosering (kg/ha)	Max dosering/vækstår (kg/ha)
Et- og flerårigt ukrudt	1	0,50-1,50	1,50

STØDBEHANDLING AF FÆLDEDE TRÆER

Nyafældede træer behandles straks efter fældning med Roundup POWERMAX XXL som sikring mod genvækst og rodsukd. Roundup POWERMAX XXL påføres med pøsel i en 10% opløsning. Behandlingen foretages på selve snitfladen, men dog især på de vedtagte dele nærmest barken. Behandlingen foretages, når træernes saftstrøm er nedgående. Behandling i træernes safttågningsperiode har ringere effekt. Bemærk, at der kan være risiko for, at der i en bestand af samme træarter kan forekomme rodsammenfletninger, og dermed mulighed for overførsel af Roundup POWERMAX XXL fra et behandlet træ til nabotræet. Pas endvidere på ved behandling af evt. rodsukd.

Stødbehandling	Antal beh./sted	Anbefalet dosering (kg/ha)	Max dosering (kg/ha)
Sikring mod genvækst og rodsukd	1	0,50	0,50

UDRYKKEDE OG UTIPLANTEDE AREALER SÅFREMME DISSE IKKE ER BEFÆSTEDE ELLER STÆRKT PERMEABLE

Roundup POWERMAX XXL kan anvendes på utiplantede arealer, såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable gennem hele vækstsesonen. Ukrudtet bør være veludviklet og i aktiv vækst på behandlingsdispenspunkt. Pas på vinddrift. Det anbefales kun at gentage behandlingen, hvis der er nyfremspiret ukrudt eller genvækst 28 dage efter den foregående behandling.

Udrykkede og utiplantede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable	Antal beh./vækstår	Sprøjtinterval	Anbefalet dosering (kg/ha)	Max dosering/vækstår (kg/ha)
Et- og flerårigt ukrudt	1		0,50-3,00	3,00
Et- og flerårigt ukrudt	2	28	0,50-3,00	3,50
Et- og flerårigt ukrudt	3	28	0,50-3,00	3,50

SPRØJTEKNIK

Det er vigtigt, at sprøjtevæsken fordeles jævnt over hele arealet. Undgå vinddrift til nabotræer og læghen, der vil skades betydeligt, hvis de rammes af Roundup POWERMAX XXL. Derfor anbefales det at anvende Lowdrift dyser som reducerer risikoen væsentligt for vinddrift.


VANDMÆNGDE: Roundup POWERMAX XXL udsprøjtet op til 400 l/ha. Ved dosering under 1,8 kg/ha anbefales højt 150 l/ha. Dysevalg: F.eks. Low-drift dyse, Hard ISO LD 02-110 eller ISO LD 03-110. Mestingsprøjtning anbefalet vandmængde 250-500 l/ha.

FREMSTILLING AF SPRØJTEVÆSKEN

Produktet tilsluttes i sprøjten fyldeudstyr samtidig med vandpåfyldning og omrøring. Ved tankblanding bør det først tilsluttede middel være væk fra fyldeudstyret inden næste middel tilsluttes. Foretag konstant omrøring af sprøjtevæsken under transport og udsprøjtning. Ved håndtering af plantebeskyttelsesmidler anvendes kemikaliesikre håndsker og beskyttelsesbriller.

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (GLYPHOSATE, AMMONIUM SALT MIXTURE)

UN 3077



SKOVBRUG OG PLANTESKOLE

Klærgøring af areal inden såning, pøking eller plantning

Inden såning, pøking eller plantning behandles arealet med Roundup POWERMAX XXL. Ukrudtet bør være veludviklet og i aktiv vækst på behandlingsdispenspunkt. Det anbefales kun at gentage behandlingen, hvis der er nyfremspiret ukrudt eller genvækst 28 dage efter den foregående behandling. Mod tokimbladet flerårigt ukrudt og kvik anvendes den højeste dosering. Bedst effekt opnås, når ukrudtet er i aktiv vækst.

Afskærmingsprøjtning

Behandling med Roundup POWERMAX XXL foretages afskærmning i ukrudtets vækstperiode med udstyr, som afskærmer sprøjtevæsken, således at kulturræet ikke rammes af blade, nåle eller bark. Pas på drift. Ukrudtet bør være veludviklet og i aktiv vækst på behandlingsdispenspunkt. Det anbefales kun at gentage behandlingen, hvis der er nyfremspiret ukrudt eller genvækst 28 dage efter den foregående behandling. Mod tokimbladet flerårigt ukrudt og kvik anvendes den højeste dosering. Bedst effekt opnås, når ukrudtet er i aktiv vækst. Kulturræer skal være rodfæstede.

Skovbrug og planteskole - kulturforberejdelse og afskærmning	Antal beh./vækstår	Sprøjtinterval	Anbefalet dosering (kg/ha)	Max dosering/vækstår (kg/ha)
Et- og flerårigt ukrudt	1		0,50-3,00	3,00
Et- og flerårigt ukrudt	2	28	0,50-3,00	3,50
Et- og flerårigt ukrudt	3	28	0,50-3,00	3,50

JULETRÆER OVER TOPPEN

Behandling med Roundup POWERMAX XXL kan foretages i rødgran, nordmannsgran og kæmpegran (grandis). Der er ikke afprøvninger af andre træarter. Ukrudt bekæmpes i juletræer over toppen på små træer om efteråret, når træernes årsskud er afmodne (forvædede), og endeknopperne er dannede. Behandlingen foretages tidligst, når juletræerne er groet godt fast på det permanente voksested, og ukrudtet er i aktiv vækst.

Rødgran, nordmannsgran og kæmpegran	Antal beh./vækstår	Anbefalet dosering (kg/ha)	Max dosering/vækstår (kg/ha)
Et- og flerårigt ukrudt	1	0,50-1,50	1,50

STØDBEHANDLING AF FÆLDEDE TRÆER

Nyafældede træer behandles straks efter fældning med Roundup POWERMAX XXL som sikring mod genvækst og rodsukd. Roundup POWERMAX XXL påføres med pøsel i en 10% opløsning. Behandlingen foretages på selve snitfladen, men dog især på de vedtagte dele nærmest barken. Behandlingen foretages, når træernes saftstrøm er nedgående. Behandling i træernes safttågningsperiode har ringere effekt. Bemærk, at der kan være risiko for, at der i en bestand af samme træarter kan forekomme rodsammenfletninger, og dermed mulighed for overførsel af Roundup POWERMAX XXL fra et behandlet træ til nabotræet. Pas endvidere på ved behandling af evt. rodsukd.

Stødbehandling	Antal beh./sted	Anbefalet dosering (kg/ha)	Max dosering (kg/ha)
Sikring mod genvækst og rodsukd	1	0,50	0,50

UDRYKKEDE OG UTIPLANTEDE AREALER SÅFREMME DISSE IKKE ER BEFÆSTEDE ELLER STÆRKT PERMEABLE

Roundup POWERMAX XXL kan anvendes på utiplantede arealer, såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable gennem hele vækstsesonen. Ukrudtet bør være veludviklet og i aktiv vækst på behandlingsdispenspunkt. Pas på vinddrift. Det anbefales kun at gentage behandlingen, hvis der er nyfremspiret ukrudt eller genvækst 28 dage efter den foregående behandling.

Udrykkede og utiplantede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable	Antal beh./vækstår	Sprøjtinterval	Anbefalet dosering (kg/ha)	Max dosering/vækstår (kg/ha)
Et- og flerårigt ukrudt	1		0,50-3,00	3,00
Et- og flerårigt ukrudt	2	28	0,50-3,00	3,50
Et- og flerårigt ukrudt	3	28	0,50-3,00	3,50

SPRØJTEKNIK

Det er vigtigt, at sprøjtevæsken fordeles jævnt over hele arealet. Undgå vinddrift til nabotræer og læghen, der vil skades betydeligt, hvis de rammes af Roundup POWERMAX XXL. Derfor anbefales det at anvende Lowdrift dyser som reducerer risikoen væsentligt for vinddrift.



VANDMÆNGDE: Roundup POWERMAX XXL udsprøjtet op til 400 l/ha. Ved dosering under 1,8 kg/ha anbefales højt 150 l/ha. Dysevalg: F.eks. Low-drift dyse, Hard ISO LD 02-110 eller ISO LD 03-110. Mestingsprøjtning anbefalet vandmængde 250-500 l/ha.

FREMSTILLING AF SPRØJTEVÆSKEN

Produktet tilsluttes i sprøjten fyldeudstyr samtidig med vandpåfyldning og omrøring. Ved tankblanding bør det først tilsluttede middel være væk fra fyldeudstyret inden næste middel tilsluttes. Foretag konstant omrøring af sprøjtevæsken under transport og udsprøjtning. Ved håndtering af plantebeskyttelsesmidler anvendes kemikaliesikre håndsker og beskyttelsesbriller.

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (GLYPHOSATE, AMMONIUM SALT MIXTURE)

UN 3077



SKOVBRUG OG PLANTESKOLE

Klærgøring af areal inden såning, pøking eller plantning

Inden såning, pøking eller plantning behandles arealet med Roundup POWERMAX XXL. Ukrudtet bør være veludviklet og i aktiv vækst på behandlingsdispenspunkt. Det anbefales kun at gentage behandlingen, hvis der er nyfremspiret ukrudt eller genvækst 28 dage efter den foregående behandling. Mod tokimbladet flerårigt ukrudt og kvik anvendes den højeste dosering. Bedst effekt opnås, når ukrudtet er i aktiv vækst.

Afskærmingsprøjtning

Behandling med Roundup POWERMAX XXL foretages afskærmning i ukrudtets vækstperiode med udstyr, som afskærmer sprøjtevæsken, således at kulturræet ikke rammes af blade, nåle eller bark. Pas på drift. Ukrudtet bør være veludviklet og i aktiv vækst på behandlingsdispenspunkt. Det anbefales kun at gentage behandlingen, hvis der er nyfremspiret ukrudt eller genvækst 28 dage efter den foregående behandling. Mod tokimbladet flerårigt ukrudt og kvik anvendes den højeste dosering. Bedst effekt opnås, når ukrudtet er i aktiv vækst. Kulturræer skal være rodfæstede.

Skovbrug og planteskole - kulturforberejdelse og afskærmning	Antal beh./vækstår	Sprøjtinterval	Anbefalet dosering (kg/ha)	Max dosering/vækstår (kg/ha)
Et- og flerårigt ukrudt	1		0,50-3,00	3,00
Et- og flerårigt ukrudt	2	28	0,50-3,00	3,50
Et- og flerårigt ukrudt	3	28	0,50-3,00	3,50

JULETRÆER OVER TOPPEN

Behandling med Roundup POWERMAX XXL kan foretages i rødgran, nordmannsgran og kæmpegran (grandis). Der er ikke afprøvninger af andre træarter. Ukrudt bekæmpes i juletræer over toppen på små træer om efteråret, når træernes årsskud er afmodne (forvædede), og endeknopperne er dannede. Behandlingen foretages tidligst, når juletræerne er groet godt fast på det permanente voksested, og ukrudtet er i aktiv vækst.

Rødgran, nordmannsgran og kæmpegran	Antal beh./vækstår	Anbefalet dosering (kg/ha)	Max dosering/vækstår (kg/ha)
Et- og flerårigt ukrudt	1	0,50-1,50	1,50

STØDBEHANDLING AF FÆLDEDE TRÆER

Nyafældede træer behandles straks efter fældning med Roundup POWERMAX XXL som sikring mod genvækst og rodsukd. Roundup POWERMAX XXL påføres med pøsel i en 10% opløsning. Behandlingen foretages på selve snitfladen, men dog især på de vedtagte dele nærmest barken. Behandlingen foretages, når træernes saftstrøm er nedgående. Behandling i træernes safttågningsperiode har ringere effekt. Bemærk, at der kan være risiko for, at der i en bestand af samme træarter kan forekomme rodsammenfletninger, og dermed mulighed for overførsel af Roundup POWERMAX XXL fra et behandlet træ til nabotræet. Pas endvidere på ved behandling af evt. rodsukd.

Stødbehandling	Antal beh./sted	Anbefalet dosering (kg/ha)	Max dosering (kg/ha)
Sikring mod genvækst og rodsukd	1	0,50	0,50

UDRYKKEDE OG UTIPLANTEDE AREALER SÅFREMME DISSE IKKE ER BEFÆSTEDE ELLER STÆRKT PERMEABLE

Roundup POWERMAX XXL kan anvendes på utiplantede arealer, såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable gennem hele vækstsesonen. Ukrudtet bør være veludviklet og i aktiv vækst på behandlingsdispenspunkt. Pas på vinddrift. Det anbefales kun at gentage behandlingen, hvis der er nyfremspiret ukrudt eller genvækst 28 dage efter den foregående behandling.

Udrykkede og utiplantede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable	Antal beh./vækstår	Sprøjtinterval	Anbefalet dosering (kg/ha)	Max dosering/vækstår (kg/ha)
Et- og flerårigt ukrudt	1		0,50-3,00	3,00
Et- og flerårigt ukrudt	2	28	0,50-3,00	3,50
Et- og flerårigt ukrudt	3	28	0,50-3,00	3,50

SPRØJTEKNIK

Det er vigtigt, at sprøjtevæsken fordeles jævnt over hele arealet. Undgå vinddrift til nabotræer og læghen, der vil skades betydeligt, hvis de rammes af Roundup POWERMAX XXL. Derfor anbefales det at anvende Lowdrift dyser som reducerer risikoen væsentligt for vinddrift.

VANDMÆNGDE: Roundup POWERMAX XXL udsprøjtet op til 400 l/ha. Ved dosering under 1,8 kg/ha anbefales højt 150 l/ha. Dysevalg: F.eks. Low-drift dyse, Hard ISO LD 02-110 eller ISO LD 03-110. Mestingsprøjtning anbefalet vandmængde 250-500 l/ha.

FREMSTILLING AF SPRØJTEVÆSKEN

Produktet tilsluttes i sprøjten fyldeudstyr samtidig med vandpåfyldning og omrøring. Ved tankblanding bør det først tilsluttede middel være væk fra fyldeudstyret inden næste middel tilsluttes. Foretag konstant omrøring af sprøjtevæsken under transport og udsprøjtning. Ved håndtering af plantebeskyttelsesmidler anvendes kemikaliesikre håndsker og beskyttelsesbriller.

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (GLYPHOSATE, AMMONIUM SALT MIXTURE)

UN 3077

