

ROUNDUP® XXL

Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse, samt stødbehandling af fældede træer og buske jf. brugsanvisningen.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Roundup®



UFI: XVU1-90YM-200J-PYTV

Virkningsmekanisme

GRUPPE 9 HERBICID



INDHOLD:

5 L iter e

Fabrikationsnr./ Produktionsdag:

FØRSTEHJÆLPS- FORANSTALTNINGER

Øjenkontakt

Skyl omgående med store mængder vand. Kontaktlinser fjernes, hvis det kan gøres nemt.

Hudkontakt

Fjern forurenet tøj, armbåndsur og smykker. Vask angrebet hud med store mængder vand. Vask tøj for genbrug.

Indånding

Anbring i frisk luft.

Indtagelse

Opkastning må ikke fremtvinges. Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Råd til læger

Behandles symptomatisk. Undersøg for pulmonal dysfunktion. Mål blodtrykket.

Ingen diagnostiske symptomer på systemisk forgiftning med dette produkt.

Hold patienten under observation, indtil tilstanden er tilfredsstillende og stabil.

Antidot

Behandling med atropin og oximer er uegnet.

Ukrudtsmiddel nr. 18-682

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmidler forordningen 1107/2009

Analyse:

Glyphosat: 360 g pr. liter (30,8 % w/w) i form af 486 g pr. liter glyphosat-isopropylaminsalt. Midlet er et vandopsløseligt koncentrat (SL).

Holdbarhed:

Produktet er holdbart til mindst 2 år efter produktionsdato

(se denne nedenfor på emballagen)

Batchnummer: (se denne nedenfor på emballagen)

Opbevares frostfrit

Bayer A/S

Arne Jacobsens Allé 13,

DK-2300 København S, Danmark

® is a registered trademark of the Bayer Group

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse for såning, herunder nedvisning af eftergrøder og efter såning før fremspiring jf. brugsanvisningen.

I følgende foderafgrøder: raps, korn, lupin, ærter, bønner, hestebønner, hør og græs, er det efter fremspiring kun tilladt at bekæmpe flerårigt ukrudt ved pletsprøjtning på mindre områder af marken. Afgrøderne må ikke behandles senere end 10 dage før høst.

Det er ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende glyphosat til nedvisning i foderafgrøder før høst i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

I følgende konsumafgrøder: konsumærter, kornsorter til malt, havre til gryn og brødkorn (rug, hvede, byg, triticale og spelt), er det efter fremspiring ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende glyphosat i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Ukrudtsbekæmpelse på stubmarker.

Omlægning af brak- og græsmarker.

Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige planteskole- og skovkulturer samt juletræsplantager.

Stødbehandling af fældede træer og buske.

Ukrudtsbekæmpelse på udrykede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable.

Ukrudtsbekæmpelse mellem og under frugttræer og bærbuske indtil 30 dage før høst og om efteråret efter høst.

Frugter og bær, fra et areal, der er behandlet med glyphosat må anvendes som foder til husdyr. Øvrige behandlede afgrøder må anvendes til foder til husdyr – dog ikke til fjerkræ og får.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Brugere skal anvende kemisk bestandige handsker ved blanding, påfyldning og udbringning med pøse.

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater op til og inklusiv 2,7 L produkt/ha.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 2,7 L produkt/ha op til og inklusiv 5,4 L produkt/ha.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 5,4 L produkt/ha (Sp3).

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forpigerende.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjtestyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Giftlinjen Ring: +45 82 12 12 12

16-02-24

145.9999 mm

ROUNDUP® XXL

Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse, samt stødbehandling af fældede træer og buske jf. brugsanvisningen. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.



BRUGSANVISNING

168,0 mm

BRUGSANVISNING:

ROUNDUP XXL kan anvendes til ukrudtsbekæmpelse før såning og efter såning for fremspiring. Ukrudtsbekæmpelse mellem og under frugttræer og bærbuske. Ukrudtsbekæmpelse på stubmarker. Omlægning af brak- og græsmarker. Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige planteskole- og skovkulturer samt juletræsplantager. Stødbehandling af fældede træer og buske. Ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer, såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable.

Pletsprøjtning mod flerårigt ukrudt efter fremspiring og før høst i foderafgrøder. **ROUNDUP XXL** virker ved, at det optages gennem bladene og fordeler sig med plantens saftstrøm rundt i hele planten. Efter 10 dage vil denne transport normalt være tilendebragt, og jorden kan bearbejdes og tilplantes. Udsprøjtning af **ROUNDUP XXL** skal foretages på tørre planter. En smule fugt i form af dug har dog ingen betydning, hvis planterne tørrer op efter udsprøjtningen. Den bedste effekt opnås, når planterne er i god vækst. Almindelig temperatur, tilpas jordfugtighed og høj luftfugtighed vil sædvanligvis give det bedste resultat. Hvis **ROUNDUP XXL** anvendes under andre forhold, må langsommere effekt forventes. Regnfast efter 4-6 timer. **ROUNDUP XXL** bindes umiddelbart til jorden og inaktiveres derfor ved berøring med denne. Afgrøder beregnet til udsæd må ikke behandles. Bemærk: Under nedbrydning af større mængde plantemateriale, f.eks. kvikrødder, kan der i nogle tilfælde dannes spirehæmmende stoffer. En grundig jordbearbejdning kan forhindre eller mindske problemet.

Jordbearbejdning: Efter behandling med **ROUNDUP XXL** kan jordbearbejdningen først begynde, når ukrudtet er påvirket af glyphosat, dog tidligst efter ti dage (syv dage ved behandling om foråret). Jordbearbejdning kan ske en dag efter behandling mod etårigt ukrudt, to dage efter behandling mod kvik og fem dage efter behandling mod flerårigt tokimbladet ukrudt. Ved lave temperaturer i længere tid kan jordbearbejdning først ske efter fem dage.

SPRØJTETEKNIK:

Det er vigtigt, at sprøjtevæsken fordeles jævnt over hele arealet.

Undgå vinddrift til naboafgrøder og læhegn, der vil skades betydeligt, hvis de rammes af **ROUNDUP XXL**.

VANDMÆNGDE: **ROUNDUP XXL** udsprøjtet i op til 200 l/ha. Ved dosering under 3 l/ha anbefales højst 150 l/ha.

Dysevalg: F.eks. Low-drift dyse, Hardi ISO LD 02-110 eller ISO LD 03-110.

® is a registered trademark of the Bayer Group



Juletræer:

I Rodgran, Nordmannsgran og Kæmpegran kan **ROUNDUP XXL** anvendes om efteråret, når strækingsvæksten er afsluttet og årsskuddene er modne og endekopperne er dannede. Tidligst når granerne er rodfaste på blivende sted.

Dosering:

2,0 l/ha i 400 - 500 l vand/ha

Max behandling er 1 gang pr. sæson.

Stødbehandling af fældede træer i skove og på industriarealer mod genvækst og rodsrud.

Nyfældede træer behandles straks efter fældning med **ROUNDUP XXL** som sikring mod genvækst og rodsrud.

ROUNDUP XXL kan f.eks. påføres med pensel eller rygsprøjte. Behandlingen foretages på selve snitfladen, men dog især på de vedagtige dele nærmest barken. Behandlingen foretages, når træernes saftstrøm er nedadgående, dvs. fra ca. oktober til slutningen af februar. Behandling i træernes saftstigningsperiode har ringere effekt. Bemærk at der kan være risiko for, at der i en bestand af samme træarter kan forekomme rod-sammenfletninger, og dermed mulighed for overførsel af **ROUNDUP XXL** fra et behandlet træ til nabotræet. Pas endvidere på ved behandling af evt. rodsrud.

Vejledende dosering:

Blanding ved temperatur over -5°C:

100 ml **ROUNDUP XXL** plus 400 ml vand.

Blanding ved temperatur under -5°C:

100 ml **ROUNDUP XXL** plus 100 ml antifrostvæske (kølervæske) plus 300 ml vand.

Antifrostvæske tilsættes for at lette udbringningen af blandingen i perioder med lave temperaturer.

Max behandling er 1 gang pr. sæson.

Rygsprøjte:

Anvendelse af rygsprøjte vil være formålstjenlig, når mindre arealer skal renholdes for ukrudt.

0,2 - 0,3 l **ROUNDUP XXL** i 10 - 15 liter vand vil kunne dække et areal på ca. 500 m². NB! Sprøjt kun på det, der skal bekæmpes. Pas på vinddrift.

Anvend evt. afskærmet sprøjtning.

Spild, rester og tom emballage

Spild: Spild opsuges med savsmuld eller sand. Samles op i plastikbeholdere der afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæskan.

Midlet må kun opbevares i originalemballagen.

Emballagen må ikke genbruges.

Rengøring af sprøjte og udstyr efter afsluttet behandling.

Det er vigtigt at hele sprøjten samt evt. traktoren rengøres grundigt umiddelbart efter afsluttet behandling enten i marken eller på vaskepladsen. Følg derfor nedenstående råd i forbindelse med denne rengøring:

- Umiddelbart efter afsluttet behandling skal tanken skylles grundigt med rent vand. Restsprøjtevæsken fortyndes minimum 50 gange. Skyllevandet sprøjtes ud på den netop behandlede mark. Ved udsprøjtning skal det sikres at den maksimalt til-ladte dosering for **ROUNDUP XXL** ikke overskrides.

- Under rengøringen aktive-res alle ventiler/hænder så alle slanger bliver rengjorte. Endvi-dere skal sprøjten tommes helt mellem hver skylning.
- Fyld rent vand i sprøjten (10 - 15 % af tankkapaciteten), og tilsæt 0,3 liter 3-dob-belt salmiakspiritus pr. 100 liter vand (evt. alm. salmiakspiritus - 1 liter pr. 100 liter vand eller All Clear Extra - 0,5 liter pr. 100 liter vand). Lad tankspuledysen arbejde i mindst 15 minutter. Skyllevandet kan udsprøjtes på den behandlede mark.
- Skyl slanger og bom, fyld igen tanken med vand og lad den stå i mindst 15 minutter under cirkulation. Tøm tanken gennem bommen/dysen over afgrøde/mark, og skyl tanken/bommen med rent vand.
- Dyser og sier rengøres separat med samme middel og koncentration, som anvendt til sprøjten. Vaske-vandet opsamlles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

GENEREL ERKLÆRING OM RESISTENS:

Alle ukrudtspopulationer kan indeholde planter, der er mere tolerante eller resistente over for visse herbicider, hvilket kan føre til dårlig bekæmpelse ved brug af disse pro-dukter. Glyphosat er et gruppe 9-herbicid baseret på virk-ningsklassificeringer tildelt af Hercide Resistance Action Committee (HRAC).

Der skal indføres en strategi mod ukrudt der tilgodeser alternative muligheder for bekæmpelse for at undgå herbicidresistens. Dette omfatter den korrekte brug af herbicider samt benyttelse af forskellige virkningsme-kanismer eller brug af mekaniske metoder til ukrudts-bekæmpelse.

- Følg anbefalingerne på etiketten, navnlig for at sikre, at behandlingen foretages i ukrudtets kor-rekte vækstfase under passende klimatiske for-hold og ved korrekt dosering.
- Brug et bredt udsnit af de værktøjer, der udgør en del af de normale programmer for bekæmpelse af ukrudt i afgrøder eller landskaber (f.eks. sæd-skifte, såtidspunkt, mekanisk bekæmpelse).
- Minimer risikoen for spredning af ukrudt. Sørg for at redskaber er rensede for jord og planter når det flyttes mellem markerne. Følg altid god sprøjte-praksis for at opnå en effektiv ukrudtsbekæmpel-se:
- Sprøjteudstyret skal kontrolleres regelmæssigt (f.eks. af autoriserede personer).
- Doser og sprøjt præcist – kalibrer sprøjten og klargør den korrekte sprøjtemængde og blan-ding til det område, der skal behandles.
- Brug de rigtige dyser for at optimere dækningen af planterne med mindst mulig afdrift.
- Følg ukrudtsplanterne efter en behandling for at kontrollere bekæmpelsen samt identificering af potentielle resistensudvikling.
- Fjern eventuel ukrudt mekanisk eller med andre effektive metoder end glyphosat for de produc-erer hvis der ikke er opnået effekt af ukrudts-bandingen.

OPBEVARING

Midlet må kun opbevares i originalemballagen.

ROUNDUP® XXL

Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse, samt stødbehandling af fældede træer og buske jf. brugsanvisningen. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

BRUGSANVISNING:

ROUNDUP XXL kan anvendes til ukrudtsbekæmpelse før såning og efter såning for fremspiring. Ukrudtsbekæmpelse mellem og under frugttræer og bærbuske. Ukrudtsbekæmpelse på stubmarker. Omlægning af brak- og græsmarker. Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige planteskole- og skovkulturer samt juletræsplantager. Stødbehandling af fældede træer og buske. Ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer, såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable.

Pletsprøjtning mod flerårigt ukrudt efter fremspiring og før høst i foderafgrøder. **ROUNDUP XXL** virker ved, at det optages gennem bladene og fordeler sig med plantens saftstrøm rundt i hele planten. Efter 10 dage vil denne transport normalt være tilendebragt, og jorden kan bearbejdes og tilplantes. Udsprøjtning af **ROUNDUP XXL** skal foretages på tørre planter. En smule fugt i form af dug har dog ingen betydning, hvis planterne tørrer op efter udsprøjtningen. Den bedste effekt opnås, når planterne er i god vækst. Almindelig temperatur, tilpas jordfugtighed og høj luftfugtighed vil sædvanligvis give det bedste resultat. Hvis **ROUNDUP XXL** anvendes under andre forhold, må langsommere effekt forventes. Regnfast efter 4-6 timer. **ROUNDUP XXL** bindes umiddelbart til jorden og inaktiveres derfor ved berøring med denne. Afgrøder beregnet til udsæd må ikke behandles. Bemærk: Under nedbrydning af større mængde plantemateriale, f.eks. kvikrødder, kan der i nogle tilfælde dannes spirehæmmende stoffer. En grundig jordbearbejdning kan forhindre eller mindske problemet.

Jordbearbejdning: Efter behandling med **ROUNDUP XXL** kan jordbearbejdningen først begynde, når ukrudtet er påvirket af glyphosat, dog tidligst efter ti dage (syv dage ved behandling om foråret). Jordbearbejdning kan ske en dag efter behandling mod etårigt ukrudt, to dage efter behandling mod kvik og fem dage efter behandling mod flerårigt tokimbladet ukrudt. Ved lave temperaturer i længere tid kan jordbearbejdning først ske efter fem dage.

SPRØJTETEKNIK:

Det er vigtigt, at sprøjtevæsken fordeles jævnt over hele arealet.

Undgå vinddrift til naboafgrøder og læhegn, der vil skades betydeligt, hvis de rammes af **ROUNDUP XXL**.

VANDMÆNGDE: **ROUNDUP XXL** udsprøjtes i op til 200 l/ha. Ved dosering under 3 l/ha anbefales højst 150 l/ha.

Dysevalg: F. eks. Low-drift dyse, Hardi ISO LD 02-110 eller ISO LD 03-110.

® is a registered trademark of the Bayer Group

121.0 mm

242.0 mm

121.0 mm

ANVENDELSESOMRÅDER

PLETSPRØJTNING EFTER FREMSPIRING OG FØR HØST I FODERAFGRØDER:

Pletsprøjtning mod flerårigt ukrudt efter fremspiring og før høst i raps, lupin, korn, ærter, bonner, hestebønner, hør og græs. Ved pletsprøjtning forstås behandling med **ROUNDUP XXL** på mindre områder af marken. Behandlingsfrist 10 dage.
Dosering: flerårigt ukrudt 2,0-4,0 l/ha
Max behandling er 1 gang pr. vækstår.

UDYRKEDE OG UTILPLANTEDE AREALER SÅFREMT DISSE IKKE ER BEFÆSTEDE ELLER STÆRKT PERMEABLE:

Roundup XXL kan anvendes på utilplantede arealer, såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable gennem hele vækstsæsonen. Ukrudtet bør være veludviklet og i aktiv vækst på behandlingstidspunktet. Pas på vinddrift. Det anbefales kun at gentage behandlingen, hvis der er nyfremspiret ukrudt eller genvækst 28 dage efter den foregående behandling.

Et- og flerårigt ukrudt	Dosering	Maks. dosering pr. vækstår
En behandling	1,50-4,5 l/ha	4,5 l/ha
To behandlinger	1,50-4,5 l/ha	7,5 l/ha
Tre behandlinger	1,50-4,5 l/ha	7,5 l/ha

STUBMARKER:

Anvendes til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt genspiret korn. Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken kan komme i god vækst. Når kvikken har 3 - 6 aktive blade, kan der behandles med **ROUNDUP XXL**. I tilfælde af at halmen snittes efter høst, må den snittes fint og fordeles godt for at opnå optimal effekt over hele marken. Behandling med **ROUNDUP XXL** bør altid foretages på ubearbejdet jord efter høst, når ukrudtet er i god vækst, og har en passende udvikling. Undgå ved høst at sætte for høj stub, som kan forringe genvæksten af kvikken. En stubbehandling kan foretages til langt hen på året, så længe klimaforholdene tillader det. Enkelte frostnætter med temperaturer ned til -3° C før sprøjtning vil ikke have indflydelse på virkningen. Jordbearbejdning kan påbegyndes 10 dage efter behandlingen.

Dosering: Genspiret korn og småt etårigt ukrudt : 1,5 - 2,0 l/ha
Kvik : 3,0 - 6,0 l/ha

Doseringen på 3 l/ha kan anvendes, når følgende betingelser er tilstede:

- * Høj luftfugtighed
- * Temperaturer over 15° C
- * Højt vejr (solskin) fra sprøjtetidspunkt (formiddag) til aften.

Max behandling er 1 gang pr. vækstår.

STUBMARKER EFTER FRØGRÆS:

Halmen bør fjernes straks efter høst, således at kvikken og græsserne kan komme i god vækst. Når kvikken har 3 - 6 aktive blade, kan der behandles med **ROUNDUP XXL**. Behandlingen med **ROUNDUP XXL** bør altid foretages på ubearbejdet jord efter høst, når ukrudtet er i god vækst og har en passende udvikling. Jordbearbejdning kan påbegyndes 10 dage efter behandlingen.

Dosering: 4,0 - 6,0 l/ha

Generelt anvendes 4 liter/ha mod kvik og genvækst af frøgræsser.

5 - 6 liter/ha anvendes til bekæmpelse af rødsvingel, engrapgræs eller andre smalbladede frøgræsarter.

Max behandling er 1 gang pr. vækstår.

OMLÆGNING AF BRAK- OG GRÆSMARKER:

For effektiv kvikbekæmpelse skal planterne være i aktiv vækst med 3 - 6 blade. For en eventuel direkte såning bør græsset samt andet plantemateriale altid fjernes fra marken. Dette kan ske allerede 10 dage efter behandling.

Dosering: Kvik og andre bredbladede græsser : 4,0 l/ha
Smalbladede græsarter : 5,0 - 6,0 l/ha

Max behandling er 1 gang pr. vækstår.

GRÆS FOR SIDSTE SLÆT:

ROUNDUP XXL anvendes til bekæmpelse af kvik og kulturgræsser inden høst af sidste slæt. Græsset og kvikken (kvik 3 - 6 aktive blade) bør være veludviklet, i god vækst og 15 - 20 cm på sprøjtetidspunktet. Vær sikker på, at kvikken ikke er dækket af afgrøden. Snarest muligt efter behandlingsfristens udløb (10 dage) høstes græsset.

Behandlet græs må ikke anvendes til foder.

Dosering: 3,0 - 4,0 l/ha

Max behandling er 1 gang pr. vækstår.

FØR SÅNING OG EFTER SÅNING FØR FREMSPIRING:

ROUNDUP XXL anvendes mod kvik samt andet fremspiret ukrudt. Effekten afhænger dog meget af udviklingsstadiet på kvikken. Kvikken skal have 3 - 4 blade på sprøjtetidspunktet. Om foråret vil kvikken normalt ikke være så veludviklet, hvorfor der må påregnes lavere effekt. **Ikke udvintrede kornplanter** i en ellers udvintret vintersædmark kan bekæmpes når der er vækst i planterne.

Dosering: Kvikbekæmpelse : 3,0 - 4,0 l/ha

Bekæmpelse af korn i udvintret vintersæd : 1,0 - 1,5 l/ha

Max behandling er 1 gang pr. vækstår.

DIREKTE SÅNING:

Anvendes **ROUNDUP XXL** i forbindelse med direkte såning, fjernes halm og andet plantemateriale.

Ved sprøjtning umiddelbart efter en direkte såning kræves det, at udsæden er godt dækket.

Dosering: Ny fremspiret tokimbladet ukrudt, enårig rapgræs og spildkorn : 1,5 l/ha
Kvikbekæmpelse : 3,0 - 4,0 l/ha

Max behandling er 1 gang pr. vækstår. Der er ingen behandlingsfrist.

FRUGT- OG BÆRPLANTAGER, IKKE SPISELIGE PLANTESKOLE OG SKOVKULTURER SAMT JULETRÆSPANTAGER:

Frugt- og bærplantager

Bedst effekt opnås når ukrudtet er i aktiv vækst. Frugttræer og bærbuske skal være rodfæstede. De angivne doseringer er beregnet på sprøjtning af hele arealet. Behandlingen gentages, hvis der er genvækst af ukrudtet 28 dage efter den foregående behandling. I rækker under afgrøderne bør der ikke behandles med **Roundup XXL** fra sidst i juni. Når saftstrømmen vender sidst i juni vil der være risiko for skader på træerne eller buskene, hvis bladene rammes. Anvend afskærmet sprøjtning eller rygsprøjt. Pas på vinddrift.

Bemærk: Planter som danner udløbere (f.eks. jordbær) eller rodstud (f.eks. hindbær, blommer, prydtæer eller buske) tilhører en særlig risikogruppe, fordi glyphosat kan transporteres fra udløberne eller rodstuddene til forældreplanterne. Med sådanne planter kan sprøjtning imellem rækkerne kun foretages, når udløbere eller rodstud i mellem rækkerne er afskåret fra moderplanterne. Behandlingsfrist 30 dage.

Ikke-spiselige planteskole- og skovkulturer samt juletræspantager

Klargøring af areal inden såning, prikling eller plantning

Inden såning, prikling eller plantning behandles arealet med Roundup XXL. Ukrudtet bør være veludviklet og i aktiv vækst på behandlingstidspunktet. Det anbefales kun at gentage behandlingen, hvis der er nyfremspiret ukrudt eller genvækst 28 dage efter den foregående behandling. Mod tokimbladet flerårigt rod ukrudt og kvik anvendes den højeste dosering. Bedst effekt opnås, når ukrudtet er i aktiv vækst.

Afskærmet sprøjtning

Behandling med Roundup XXL foretages afskærmet i ukrudtets vækstperiode med udstyr, som afskærmer sprøjtevæsken, således at kulturtræet ikke rammes på blade, nåle eller bark. Pas på adrift. Ukrudtet bør være veludviklet og i aktiv vækst på behandlingstidspunktet. Det anbefales kun at gentage behandlingen, hvis der er nyfremspiret ukrudt eller genvækst 28 dage efter den foregående behandling. Mod tokimbladet flerårigt rod ukrudt og kvik anvendes den højeste dosering. Bedst effekt opnås, når ukrudtet er i aktiv vækst. Kulturtræarterne skal være rodfæstede.

Frugt- og bærplantager, skovkulturer samt juletræspantager	En behandling	To behandlinger	Tre behandlinger
Frugt- og bærplantager	1,5-6,0 l/ha Total mængde for en beh. pr. sæson 6,0 l	1,5-6,0 l/ha Total mængde for to beh. pr. sæson 9,0 l	1,5-6,0 l/ha Total mængde for tre beh. pr. sæson 10,0 l
Ikke-spiselige planteskole- og skovkulturer samt juletræspantager	2,0-6,0 l/ha Total mængde for en beh. pr. sæson 6,0 l	2,0-6,0 l/ha Total mængde for to beh. pr. sæson 10,0 l	2,0-6,0 l/ha Total mængde for tre beh. pr. sæson 10,0 l

PRODUKTANSVAR:

Producenten er ansvarlig for varens kvalitet og ensartethed. Producenten erklærer endvidere, at midlet under normale forhold, er rimeligt egnet til de i brugsanvisningen angivne formål. Producenten fralægger sig derimod ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet. Ved produktets effekt forstås både den utilsigtede eller manglende virkning produktet måtte have.

168.0 mm