


	EFTERÅR	ANBEFALING	KOMMENTAR
KLARGØRING AF MARKEN 	Før jordbehandling/såning	Nedvisning af frøgræsmark før såning	2-3 kg/ha Roundup PowerMax XL. Tromling før behandling kan øge nedvisningseffekten
	Før jordbehandling/såning	Nedvisning af ukrudt/græsser før jordbearbejdning	1,5-2,0 kg/ha Roundup PowerMax XL
RAPSETABLERING 	Såning	30-35 planter/m ² ved bredsåning 20-25 planter/m ² i rækkesåning 35-45 planter/m ² CA system 40-50 planter/m ² direkte efter frøgræs	Veltillberedt såbed i august, så snart forholdene er til det. Sådybde 2 cm i et godt såbed. Ved tørt såbed 3-4 cm På sandjord hæves planteantal med 10 planter/m ²
	Gødning	40-80 kg N/ha ved såning	Tidlig såning i august 40 kg N/ha. Midt/ultimo august 60-80 kg N/ha. Gerne NP/NPK gødning. Ved anvendelse af gylle tilføres ekstra 20 kg N/ha i handelsesgødning ved såning
	Snegle	3-5 kg/ha Sneglekorn	Placeres eller spredes ved såning. Kan være nødvendig med flere behandlinger
UKRUDTSBEKÆMPELSE FØR FREMSPIRING 	Ukrudt før fremspiring	0,2-0,25 l/ha Centium 36 CS	Fra såning til lige før fremspiring. Udsæt sprøjtning ved udsigt til meget regn i efterfølgende dage. God effekt på enårig rapgræs, burresnerre, hyrdetaske, fuglegræs, samt nogen effekt på væselhale
PLEJE AF RAPSEN EFTER FREMSPIRING 	Rapsjordlopper	0,2 l/ha Lamdex	Behandling ved konstateret angreb af rapsjordlopper, kan evt. blandes med spildkornsbekæmpelse fra rapsens stadie 13 til 16
	Spildkorn	0,2-0,3 l/ha Agil	Spildkorn bekæmpes ved 2-3 blade, fra rapsens stadie 13 til 16. Tilsæt 0,15 l/ha klæbemiddel. Ved reduceret jordbehandling kræves ofte to behandlinger mod spildkorn. Max to behandlinger.
	Rajgræs, spildkorn	1,0-1,5 l/ha Focus Ultra	Rajgræs bekæmpes ved 3-5 blade, fra rapsens stadie 13-32. Tilsæt 0,5 l/ha Dash
HOLD RAPSEN I TOPFORM 	Vækstregulering	0,35-0,7 l/ha Caryx	Særlig ved tidlig såning før midten af august, hvor der anvendes gylle, tildeles høj N (>60 kg N/ha), højt planteantal og forager. Behandling når de største rapsplanter har udviklet 4-6 blade.
	Ukrudtsbekæmpelse efter fremspiring	0,25-0,5 l/ha Belkar	Splitbehandling med 2 x 0,25 l/ha, anbefales hvis der er uens fremspiring eller planter i forskellig størrelse. 1. splitbehandling når rapsen har 2 til 5 blade. 2. behandling ca 3 uger senere
	Skadedyr	0,2 l/ha Lamdex	Mod skadedyr behandles i første halvdel af oktober, hvis der har været angreb af rapsjordlopper i fremspiringsfasen
SIDSTE ARBEJDSOPGAVE I EFTERÅRET 	Græsukrudt før vinter	1,25 l/ha Kerb 400 SC	Behandling november-december. Bekæmpelse mod vanskeligt græsukrudt og spildkorn inklusiv resistente ukrudtsarter



SÅTIDSPUNKT OG AGRONOMI FOR DEKALB VINTERRAPSSORTER



Find dit områdes farve på kortet og se det anbefalede såtidspunkt i skemaerne til højre



LANGSOM EFTERÅRSVÆKST SORT: DK EXLEVEL OG DK EXBURY

	August				September
	1-9	10-16	17-22	23-31	1-8
Udsatte kolige områder					
Kolige områder					
Moderate områder					
Lunere områder					
Varme områder					

HURTIG EFTERÅRSVÆKST SORT: DK EXSTEEL, DK EXPECTATION OG V367OL

	August				September
	1-9	10-16	17-22	23-31	1-8
Udsatte kolige områder					
Kolige områder					
Moderate områder					
Lunere områder					
Varme områder					

HURTIG EFTERÅRSVÆKST (KÅLBROKTOLERANT) SORT: DK PLASMA OG DK PLACID

	August				September
	1-9	10-16	17-22	23-31	1-8
Udsatte kolige områder					
Kolige områder					
Moderate områder					
Lunere områder					
Varme områder					

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde.
Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.
Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarsels-
symboler, der fremgår af etiketten.

Hør mere hos din konsulent
eller læs mere på
www.cropsscience.bayer.dk



Christian
Søndergaard Christensen
2894 3024



Jens-Richardt
Thyssen
2810 4611



Klaus
Nielsen
2894 2068