

Foråret starter med Cossack

– Følg **Cossack Vejret** og tilpas dosis efter ukrudtets størrelse



COSSACK[®]

VEJRET

0,93 l/ha Cossack
Stort græsukrudt



0,7 l/ha Cossack
Mellem græsukrudt



0,5 l/ha Cossack
Småt græsukrudt



Tjek dit lokale Cossack Vejr
på www.cropscience.bayer.dk

COSSACK[®]



Cossack OD – den komplette ukrudtsløsning i foråret i vinterhvede, rug og triticale

- // Høj effekt på rajgræs, agerrævehale, rapgræs, vindaks og tokimbladet ukrudt
- // God effekt på væselhale og flyvehavre
- // Kør så tidligt som muligt i foråret, når der er vækst i ukrudtet – tjek Cossack Vejret for optimal timing
- // Bedst effekt opnås på små ukrudtsplanter i god vækst
- // Cossack er blevet genregistreret med ny etiket og dosering, som i løbet af 2026 vil komme i markedet

AFGRØDER	DOSERING	BEMÆRKNING
Vinterhvede og triticale	0,5-0,73 l/ha (st. 20-22) 0,73-0,93 l/ha (st. 23-32)	Tilsætning af 2 l/ha FieldPower eller 5 kg N/ha i flydende gødning kan øge effekten mod agerrævehale, væselhale og rajgræs – kun i vinterhvede
Rug	0,5-0,6 l/ha (st. 20-32)	I rug må max. anvendes 0,6 l/ha

Tilsæt 0,5 l/ha olie til Cossack. Anvendes 2 l/ha FieldPower tilsættes der ikke olie. I vinterhvede kan blandes med max. 0,5 l/ha CCC.

Husk at behandle på tørre planter og sørg for en god dækningsgrad på ukrudtet.

Tilsæt evt. DFF ved agerstedmoder og ærenpris. Tilsæt Pixxaro eller Zypar ved storkenæb eller resistent fuglegræs.

Effektskema

	Ukrudt 3-4 blade			Ukrudt >6 blade		
	0,5 l/ha	0,7 l/ha	0,93 l/ha	0,7 l/ha	0,93 l/ha	
Vindaks	95-100 %	95-100 %	95-100 %	95-100 %	95-100 %	
Rajgræs, alm	95-100 %	95-100 %	95-100 %	95-100 %	95-100 %	
Rajgræs, italiensk	95-100 %	95-100 %	95-100 %	95-100 %	95-100 %	
Rapgræs, alm	95-100 %	95-100 %	95-100 %	95-100 %	95-100 %	
Rapgræs, enårig	95-100 %	95-100 %	95-100 %	95-100 %	95-100 %	
Hanespore	70-84 %	70-84 %	70-84 %	70-84 %	70-84 %	
Agerrævehale	50-69 %	50-69 %	50-69 %	50-69 %	50-69 %	
Flyvehavre	50-69 %	50-69 %	50-69 %	50-69 %	50-69 %	
Væselhale (bedst effekt opnås om efteråret med Mateno Duo)	50-69 %	50-69 %	50-69 %	50-69 %	50-69 %	
Goldhejre (opfølgning senere med andet græsmiddel)	50-69 %	50-69 %	50-69 %	50-69 %	50-69 %	
Forglemmigej, mark	95-100 %	95-100 %	95-100 %	95-100 %	95-100 %	
Fuglegræs	95-100 %	95-100 %	95-100 %	95-100 %	95-100 %	
Hanekro	95-100 %	95-100 %	95-100 %	95-100 %	95-100 %	
Kamille, lugtløs	95-100 %	95-100 %	95-100 %	95-100 %	95-100 %	
Raps	95-100 %	95-100 %	95-100 %	95-100 %	95-100 %	
Burresnerre	95-100 %	95-100 %	95-100 %	95-100 %	95-100 %	
Valmue, korn	95-100 %	95-100 %	95-100 %	95-100 %	95-100 %	
Pileurt, fersken	95-100 %	95-100 %	95-100 %	95-100 %	95-100 %	
Tvetand	95-100 %	95-100 %	95-100 %	95-100 %	95-100 %	
Ærenpris, storkronet	70-84 %	70-84 %	70-84 %	70-84 %	70-84 %	
Ærenpris, mark	70-84 %	70-84 %	70-84 %	70-84 %	70-84 %	
Pileurt, snerle	70-84 %	70-84 %	70-84 %	70-84 %	70-84 %	
Stedmoder, ager	50-69 %	50-69 %	50-69 %	50-69 %	50-69 %	
Storkenæb	50-69 %	50-69 %	50-69 %	50-69 %	50-69 %	

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse.

Vær opmærksom på de advarselsætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

Pixxaro®, Zypar® Corteva

Kilde: PVO

Hør mere hos din konsulent eller læs mere på www.cropscience.bayer.dk



Christian Søndergaard Christensen
2894 3024



Jens-Richardt Thyssen
2810 4611



Klaus Nielsen
2894 2068

COSSACK®

