

Brugsanvisning

Afgrøde	Skadevolder	Dosering	Tidspunkt og metode
Kartofler	Rodfiltsvamp (<i>Rhizoctonia solani</i>)	60 ml/100 kg kartofler 1, 8 l/ha ved 3 tons knolde/ha (450 g pencycuron/ha ved 3 tons knolde/ha)	Anvendes som vådbejds ved påsprøjtning af læggekartoflerne under lægningen med specialudstyr, eller på rullebord ved udsortering i lagerhus.

F.eks. udbragt med:

Rækkeafstand	Dysenr.	Km/h	Tryk i bar	Vand
0,75	2 x 1299-8	6	2,5	70 l/ha
0,80	2 x 1299-8	6	2,9	70 l/ha
0,75	2 x 1299-8	7	3,4	70 l/ha
0,80	2 x 1299-8	7	3,9	70 l/ha

Rullebord

Anvend 0,6 - 1 ltr væske/tons kartofler. Sørg for at kartoflerne er uden jord. Efter bejdsning må kartoflerne ikke lagres i storsække, men skal opbevares i kasser for at sikre en hurtig tørring, eller lægges direkte efter bejdsning.

Anvendelse

Kartoflerne oversprøjtes under det frie fald fra læggeren mod jorden. Udsprøjtningen foregår med specialudstyr, (Hardi), påmonteret læggeren. Der monteres to dyser pr. række med en indbyrdes afstand på 25 cm. Dyserne indstilles således, at kartoflerne rammes fra 2 forskellige sider. Dyserne skal pege skråt nedad i vinkler på henholdsvis 25° og 35°. Det er vigtigt, at dyserne indstilles, så de ikke befugter læggebandene, da det kan medføre øget smitterisiko af sortbensyge. Bejdsning af forspirede kartofler er også mulig. En anden mulighed er anvendelse af anlæg af typen "Viby-teknik". Anvend så lav væskemængde som muligt – anvend 2 – 4 ltr/tons kartofler. Sørg for at dyserne er monteret ca. 20 cm fra læggekedden, således at væsken ikke rammer denne.

Virkningsforhold

Monceren FS 250 er et kontaktmiddel (har ingen systemisk virkning) med lang virkningstid overfor kartoflens rodfiltsvamp. For at opnå en god effekt, er det afgørende med en jævn fordeling af midlet på knoldene. Ved behandlingen opnås såvel god virkning mod den knoldbårne smitte samt tillige nogen virkning mod den jordbårne smitte.

Bemærk!

Monceren bør kun anvendes på sundt læggemateriale (uden mekaniske skader, bakterie- eller virusangreb og med god spiringsevne og grokraft). For bl.a. at undgå bakterieinfektion, bør det sikres, at kartoflerne ikke skades i forbindelse med lægning. Hvis lægning sker under forhold, der forsinket fremspiringen (koldt, vådt og/eller dybt), kan bejdsningen yderligere forsinke fremspiringen under sådanne højrisiko forhold. Under sådanne betingelser bør der ikke bejdses.

Tankblanding

For at opnå bred effekt på almindeligt forekommende sygdomme anbefales det, at der blandes med et egnet godkendt middel. Følg altid etikettens anvisninger for blandingspartnere. Monceren FS 250 kan blandes med Prestige FS 370.

Fremstilling af sprøjtevæsken

Ved Vibyanlæg fyldes den afmålte mængde vand i beholderen, og Monceren FS 250 hældes i under omrøring. Ved Hardianlæg: Kemikalierne tilsættes i sprøjtens fyldeudstyr samtidig med vandpåfyldning og om omrøring. Foretag konstant omrøring af sprøjtevæsken under transport og udsprøjtning.

Ved håndtering af plantebeskyttelsesmidler anvendes personligt beskyttelsesudstyr, såsom egnede handsker og briller. Sprøjtevæsken anvendes umiddelbart efter tilberedning.

Rengøring

Slang og dyser skylles igennem hver dag efter endt bejdsning, for at hindre at midlet størkner og derved tilstopper dyserne.

Rester og tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skylllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Resistens

Monceren 250 FS indeholder aktivstoffet pencycuron der tilhører FRAC gruppe B4. Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i udvikling af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme.

Ansvar

Bayer CropScience fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

Opbevaring: Tåler ned til -5°C.

10.2015

Svampemiddel, nr 18-265

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse

pencycuron.....250 g/l (22,8% w/w)

Indeholder: 1,2-benzisothiazolin-3-on (BIT) og 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (C(M)IT). Kan udløse allergisk reaktion" (EUH 208).

Netto 5 liter

Flydende

Midlet er et suspensionspræparat til bejdsning.

Fabr. nr. Påtrykt emballagen

Produktet er ved korrekt opbevaring og uåbnet emballage holdbart i 2 år efter produktionsdatoen.

Produktionsdatoen er påtrykt emballagen.

® is a registered trademark of the Bayer Group



Bayer A/S
Bayer CropScience
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Telefon 45 23 50 00
www.cropscience.bayer.dk



Bayer CropScience

UN 3082



5 liter

Svampemiddel

Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler mod svampesygdomme i forbindelse med lægningen eller i forbindelse med udsortering i lagerhus. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Reg.nr. 18-265

DK06116700J

monceren® FS 250

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare EUH401).

Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger (H410).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plante-

beskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler mod svampesygdomme i forbindelse med lægningen eller i forbindelse med udsortering i lagerhus.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Må ikke tømmes i kloakafføb.

Ved lægning skal de bejdsede kartofler dækkes med jord. Ikke dækkede kartofler skal opsamles.

Ved indendørs bejdsning skal de bejdsede læggekartofler umiddelbart efter bejdsningen opbevares i en veldefineret afgrænset enhed. Ved sortering af læggekartofler skal disse straks emballeres i en beholder eller emballage og plomberes.

De bejdsede kartofler er bejdsede med Monceren FS 250 som indeholder pencycuron.

De bejdsede kartofler må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.

Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen eller emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Indånding: Bring personen i frisk luft.

Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand P302+P352).

Øjne: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

