



PREVICUR[®]
ENERGY

1 liter

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesydomme i salat på friland og i væksthuse, småplanter af hovedkål, blomsterkål og rosenkål samt tomat og agurk dyrket i stenuld eller i jord.

Gældende fra 26. november 2015:

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Skal opbevares frostfrit

® is a registered trademark of the Bayer Group

Reg.nr.18-544



Bayer A/S
Bayer CropScience
Arne Jacobsens Alle 13
DK-2300 København S
Telefon 45 23 50 00
www.bayercropscience.dk



Bayer CropScience

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Mistanke for at skade det ufoede barn (H361d).

Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer (H413).

Undgå indånding af spray (P261).

Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj (P280). Anvend de påkrævede personlige værnemidler (P281).

Ved håndtering af småplanter bør anvendes kemisk bestandige handsker.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpilgite sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesydomme i salat på friland og i væksthuse, småplanter af hovedkål, blomsterkål og rosenkål samt tomat og agurk dyrket i stenuld eller i jord.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i tomater og agurker ikke anvendes senere end 3 dage før høst.

Må i salat ikke anvendes senere end 21 dage før høst.

Må i salat på friland efter vækststadiet (BBCH) 40 ikke udbringes i en vandmængde under 1.000 l/ha for at beskytte fugle (SPe).

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P102+P405).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Indånding: Bring personen i frisk luft.

Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302+ P352).

Ved hudirritation eller udslett: Søg lægehjælp (P333+P313).

VED EKSPONERING eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313).

Tilsmudset tøj skal vaskes, før det bruges igen (P363).

Øjne: VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).



BRUGSANVISNING

Anvendelsesområde og virkningsspektrum

Previcur Energy anvendes til bekæmpelse af salatsskimmel (*Bremia lactucae*) på salat, "faldesyge" eller "damping-off" forårsaget af *Pythium* spp. på småplanter af salat, hovedkål, blomsterkål og rosenkål, tomat og agurk under formeringen samt til forebyggende behandling af tomat og agurk mod *Pythium* spp. ved tilførelse via drypvanding. Der vil kunne opnås sideeffekt på en række andre *Oomyceter*, herunder arter af *Phytophthora*. For at sikre god kontrol af sygdomme forårsaget af *Oomyceter* skal Previcur Energy anvendes forebyggende.

Virkemåde

Previcur Energy er et systemisk svampemiddel, der indeholder en kombination af to aktivstoffer, propamocarb og fosetyl, som effektivt beskytter rodder og overjordiske plantedele af bredbladede afgrøder mod *Oomyceter*. Kombinationen har multisite virkning og er derfor velegnet som del af en strategi for at undgå resistens. Midlet har direkte effekt ved at modvirke

mycelievækst/indtrængning samt sporeproduktion og -spiring. Indirekte har midlet effekt ved at stimulere plantens naturlige forsvarsmekanismer og fremmer væksten.

Resistens

Previcur Energy indeholder aktivstofferne propamocarb der tilhører FRAC gruppe F4 og fosetyl-Al der tilhører FRAC gruppe med ukendt resistens kode.

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i udvikling af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum.

Biologisk bekæmpelse

Det er ikke oplyst, om midlet er foreneligt med biologisk bekæmpelse.

Fremstilling af sprøjtevæsken

Kemikalierne tilsættes i sprøjten fyldedyr samtidig med vandpåfyldning og omrøring. Ved tankblanding bør det først

Doosering og anvendelsestidspunkt

Salat

Pythium spp.

Udvandet for udplantning. 1. behandling lige efter såning og inden fremspiring, 2. behandling efter fremspiring, 10-14 dage senere.

3 ml/m²

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Salatsskimmel

Forebyggende behandling ved sprøjtning efter udplantning. Efterfølgende behandling ca. 10 dage senere.

2,5 ltr./ha

Udbringes i 250-1.000 ltr. vand/ha Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Hovedkål, blomsterkål og rosenkål

Pythium spp.

Udvandet for udplantning. 1. behandling lige efter såning og inden fremspiring, 2. behandling efter fremspiring, 10-14 dage senere.

3 ml/m²

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Tomater og agurker dyrket på stenuld eller lign.

Pythium spp.

Udvandet for udplantning: 1. behandling lige efter såning og inden fremspiring, 2. behandling efter fremspiring, 10-14 dage senere.

3 ml/m²

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Tomater og agurker dyrket i jord

Pythium spp.

Udvandet for udplantning: 1. behandling lige efter såning og inden fremspiring, 2. behandling efter fremspiring, 10-14 dage senere.

3 ltr./ha

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 4 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.

Udbringes på fugtigt vækstmedium i 2-4 ltr. vand/m² Max. 2 behandlinger pr. afgrøde.